




NUEVA SUBESPECIE DE CONTOPUS CARIBAEUS (AVES) PARA CUBA.

PEDRO REGALADO RUÍZ

RESUMEN

UNA NUEVA SUBESPECIE DEL BOBITO CHICO (*CONTOPUS CARIBAEUS*) SE DESCRIBE EN EL PRESENTE TRABAJO. ESTA SUBESPECIE SE LOCALIZA EN CAYO ANCLITAS, ARCHIPIÉLAGO DE LOS JARDINES DE LA REINA, CAMAGÜEY, CUBA. SE INCLUYEN ADEMÁS ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE SU DISTRIBUCIÓN Y HABITAT.

ABSTRACT

A NEW SUBSPECIES OF CONTOPUS CARIBAEUS FROM CUBA IS DESCRIBED IN THIS PAPER. THIS SUBSPECIES IS LOCATED IN "CAYO ANCLITAS", SEVERAL MILES SOUTH TO CAMAGÜEY PROVINCE, CUBA. COMMENTS ON ITS DISTRIBUTION AND HABITAT ARE ALSO GIVEN.

RÉSUMÉ

UNE NOUVELLE SOUS-ESPECE DE CONTOPUS CARIBAEUS DE CUBA EST DÉCRITE DANS CET ARTICLE. CETTE SOUS-ESPECE EST LOCALISÉE DANS "CAYO ANCLITAS", PLUSIEURS MILLES AU SUD DE LA PROVINCE DE CAMAGÜEY, À CUBA. EN OUTRE, ON FAIT L'INCLUSION DE QUELQUES COMMENTAIRES SUR SA DISTRIBUTION ET SON HABITAT.

EL ESTUDIO DE LA FAUNA DE LOS CAYOS ES FUNDAMENTAL PARA EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES EN EL ARCHIPIÉLAGO CUBANO.

DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SE HAN EFECTUADO NUMEROSAS INVESTIGACIONES EN UNA BUENA PARTE DE ESOS CAYOS, PRINCIPALMENTE PARA ESTUDIAR LA FAUNA DE VERTEBRADOS. EN ALGUNAS DE ESTAS INVESTIGACIONES SE DESCUBRIERON Y CLASIFICARON VARIAS SUBESPECIES DE REPTILES, AVES Y MAMÍFEROS (JUTÍAS, GÉNERO *CAPROMYS*) LO QUE CONTRIBUYÓ AL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN ZOOGEOGRÁFICA DE LA FAUNA, SIGNIFICANDO IGUALMENTE QUE EL AISLAMIENTO GEOGRÁFICO DE ALGUNOS DE ESTOS CAYOS, ES LO SUFICIENTEMENTE ANTIGUO PARA QUE SEA VIABLE EL RECONOCIMIENTO DE TAXONES NUEVOS, AÚN A NIVEL ESPECÍFICO.

CASI TODAS ESTAS EXPLORACIONES FUERON REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA (HOY ZOOLOGÍA) DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA Y TENÍAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ESTUDIO TAXONÓMICO DE LAS ESPECIES, AUNQUE TAMBIÉN SE HICIERON APORTES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALGUNAS DE ELLAS. LOS ASPECTOS ZOOGEOGRÁFICOS Y ECOLÓGICOS NO FUERON PRÁCTICAMENTE ESTUDIADOS Y SERÁ NECESARIO PROFUNDIZAR EN ELLO EN LAS FUTURAS INVESTIGACIONES QUE SE EJECUTEN, YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA COMPLETA REGIONALIZACIÓN FAUNÍSTICA DEL PAÍS Y UNA DIVISIÓN ZOOGEOGRÁFICA ENFOCADA A LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LAS ESPECIES VERTEBRADAS EN EL TERRITORIO CUBANO.

POR OTRA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO FORESTALES (INDAF) COMO INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA DE CUBA, HA REALIZADO VARIAS INVESTIGACIONES A DETERMINADOS CAYOS, CON EL FIN DE CONOCER LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (EXTAILES). EN EL MES DE ABRIL DE 1975 CUMPLIMENTANDO DICHS PLANES DE INVESTIGACIÓN, REALICÉ UN VIAJE A LOS CAYOS DEL LLAMADO "LABERINTO DE LAS DOCE LEGUAS", ARCHIPIÉLAGO DE LOS JARDINES DE LA REINA, AL SUR DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE CAMAGÜEY (HOY CIEGO DE ÁVILA), CON EL PROPÓSITO DE ESTUDIAR LA AVIFAUNA DE ESA REGIÓN POCO EXPLORADA DE CUBA (SENSU LATO).

LOS CAYOS VISITADOS EN DICHA OCASIÓN FUERON CAYO CABALLONES Y CAYO ANCLITAS, LOS DOS MÁS GRANDES DE ESTE ARCHIPIÉLAGO Y, AL MISMO TIEMPO, LOS MÁS DISTANTES DE CUBA (SENSU STRICTO) YA QUE SE ENCUENTRAN A MÁS DE 100 KILOMETROS AL SUR DE LOS PUERTOS DE ACCESIBILIDAD MÁS CERCANOS COMO EL DE JÚCARO Y EL DE SANTA CRUZ DEL SUR.

ESTOS CAYOS GEOLOGICAMENTE HABLANDO, CONSTITUYEN UNA FORMACIÓN MÁS RECIENTE QUE LOS CAYOS DE LA COSTA NORTE DE LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY. LA VEGETACIÓN EN LOS DE LA COSTA SUR ES MUY ESCASA Y FORMADA ESENCIALMENTE POR PALMAS YURAGUANO (*COCCOTHRINAX* SP.) Y ALGUNOS ÁRBOLES COMO EL GUAO DE COSTA (*METROPIUM TOXIFERUM*), PREDOMINANDO LOS ARBUSTOS TÍPICOS DE PLAYAS ARENOSAS, SIN EXISTIR UNA VERDADERA FORMACIÓN BOSCOSA, EXCEPTO CONSIDERANDO EL MANGLAR Y EL UVERAL (*COCCOLOBA UVIFERA*), AUNQUE ESTA ÚLTIMA FORMACIÓN NO EXISTE EN CAYO ANCLITAS, SÓLO EN CABALLONES.

ESTO LLAMA LA ATENCIÓN, YA QUE ESTOS DOS CAYOS ESTÁN MUY CERCA UNO DEL OTRO, SEPARADOS POR UN BRAZO DE MAR LLAMADO "CANAL DE CABALLONES" DE APENAS 3 KMS. DE ANCHO, Y A PESAR DE ESTA CERCANÍA Y PRESENTANDO AMBOS SIMILITUDES ADÁFICAS (ARENOSOS AL SUR, ROCOSOS AL NORTE), PRESENTAN DIFERENCIAS FITOLÓGICAS, TANTO EN FISONOMÍA COMO EN FLORÍSTICA. ADEMÁS ESTA DIFERENCIA TAMBIÉN SE MANIFIESTA EN LA FAUNA, YA QUE EN CABALLONES HAY VARIAS ESPECIES DE AVES QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL PRIMERO Y VICEVERSA. POR EJEMPLO, ME LLAMÓ LA ATENCIÓN NO ENCONTRAR EL BOBITO CHICO, (*CONTOPUS CARIBAEUS*) QUE SIN EMBARGO ES BASTANTE COMÚN EN ANCLITAS Y QUE RESULTÓ ESTAR REPRESENTADO EN ESTE CAYO POR

UNA POBLACIÓN DIFERENTE A LAS OTRAS QUE VIVEN EN EL ARCHIPIÉLAGO CUBANO, LO CUAL DESCRIBO A CONTINUACIÓN.

CONTOPUS CARIBAEUS FLORENTINOI, NUEVA SUBESPECIE FLORENTINOI,

HOLOTIPO- HEMBRA ADULTA, No. 43, DEPOSITADA EN LA COLECCIÓN DIDÁCTICA P.R. DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO FORESTALES, COLECTADA POR PEDRO REGALADO RUIZ, EL 6 DE ABRIL DE 1975.

LOCALIDAD TÍPICA- CAYO ANCLITAS (20° 50' N; 78° 50' W), LABERINTO DE LAS DOCE LEGUAS, ARCHIPIÉLAGO DE LOS JARDINES DE LA REINA, PROVINCIA DE CAMAGÜEY, CUBA.

PARÁTIPO- MACHO ADULTO, No. 46, COLECTADO EL 1RO, DE ABRIL DE 1975.

DISTRIBUCIÓN- OBSERVADO EN TODOS LOS HABITATS DE CAYO ANCLITAS, AUNQUE MÁS ABUNDANTE EN EL MANGLAR.

DIAGNOSIS- UNA SUBESPECIE DE CONTOPUS CARIBAEUS CON LAS PARTES INFERIORES CASI BLANCAS; EL PECHO GRIS PARDUZCO; GARGANTA Y VIENTRE BLANQUECINOS; BARRAS ALARES (COBERTORAS) APENAS MARCADAS; DORSO PARDO GRISÁCEO.

MEDIDAS- HOLOTIPO: ALA, 7A; COLA, 66.5; CULMEN, 14.5; TARSO, 15.1; PARATIPO: ALA, 68; COLA, 67.5; CULMEN, 15; TARSO, 14.9.

COMPARACIONES: DIFIERE DE LA FORMA DEL ARCHIPIÉLAGO DE LOS CANARREOS, CONTOPUS CARIBAEUS MORENOI, BURLEIGH Y DUVALL, POR PRESENTAR EL VIENTRE CASI BLANCO CON UN VISO AMARILLENTO APENAS VISIBLE; PECHO DE TONO GRIS PARDUZCO SIN VISO AMARILLO U OCRE, COMO EN MORENOI. LA GARGANTA ES MÁS BLANCA EN FLORENTINOI. LAS BARBAS ALARES ESTÁN MUY POCO MARCADAS Y APENAS SE NOTAN EN EL NUEVO TAXON, EN COMPARACIÓN CON LAS OTRAS POBLACIONES DE CUBA. PORSALMENTE SE ASEMEJA MÁS A MORENOI PERO RESULTA EVIDENTE SU TONALIDAD MÁS GRISÁCEA. CON LAS OTRAS SUBESPECIES NO ES NECESARIA LA COMPARACIÓN YA QUE SON MÁS DIFERENTES EN COLORIDO.

ETIMOLOGÍA- EN HONOR DE FLORENTINO GARCÍA MONTAÑA, ORNITÓLOGO Y PROFESOR DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA, COMO RECONOCIMIENTO A SUS VALIOSAS ENSEÑANZAS.

RECONOCIMIENTOS

QUIERO EXPRESAR MI RECONOCIMIENTO AL COMPAÑERO SILVICULTOR, JOSÉ R. GÓMEZ RICAÑO, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES POR SU APOYO CONSTANTE A NUESTRAS INVESTIGACIONES, Y AL CO. JORGE LUIS LUNA DEL CUERPO DE GUARDABOSQUES, QUIEN ME AYUDÓ EN LA EXPLORACIÓN DE LOS CAYOS ANCLITAS Y CABALLONES.

LITERATURA CITADA

REGALADO RUIZ, PEDRO

1977, DIEZ AÑO DE FAUNA, REV. FORESTAL:31

TRABAJOS DE DIVULGACIÓN ZOOGEOGRÁFICA, PÁG.41